



DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DURANTE EL PERIODO ENERO 2016 A DICIEMBRE 2017.

Yossi Andreina Lozano Useche¹, Álvaro Eduardo Uribe Gil², María Victoria Figueroa Ramírez³

1. Estudiantes X Semestre programa de Medicina. Semillero de investigación HYGEA, Universidad de Pamplona.
2. Asesor Científico, MD Ginecoobstetra, Hospital Universitario Erasmo Meoz.
3. Asesor Metodológico, Docente programa de Medicina Universidad de Pamplona.

Introducción La Mortalidad Materna que se define como aquella muerte que ocurre durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto por una causa relacionada o agravada por el embarazo . Es uno de los indicadores económicos más importantes en los países según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2), teniendo en cuenta que la gran mayoría de las muertes maternas suceden en los países con más limitaciones económicas, se debe mencionar que varios países, entre ellos Colombia, contrajeron el compromiso de erradicar la pobreza en el mundo comprometiéndose en lo que se conoce como los objetivos del milenio (ODM), a su vez que el quinto de dichos objetivos es el compromiso en mejorar la salud materna en el mundo. Actualmente surge un nuevo compromiso en la agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) entre ellos el número tres, donde una de las metas es reducir la Razón de mortalidad materna mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos (NV)entre 2016 y 2030 **Objetivo.** Caracterizar las causas que ocasionan mortalidad materna en el departamento Norte de Santander y en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz (ESE HUEM) durante el periodo enero de 2016 a diciembre de 2017.**Metodología** Es un estudio cuantitativo no experimental, descriptivo de corte transversal. la información requerida se obtiene de bases de datos reportados al SIVIGILA del Instituto Departamental de Salud (IDS), bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la revisión de historias clínicas de las pacientes atendidas en el servicio de Ginecoobstetricia en la ESE HUEM durante los años 2016 y 2017. **Resultados** se evidencia un mayor número de casos es de los 20-30 años contrario a lo expresado en gran parte de literatura que identifican como un embarazo de alto riesgo a las mujeres mayores de





DEPARTAMENTO DE MEDICINA

35 años, entre ellos, el artículo “La edad de la mujer como factor de riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil”, el cual concluye que este mismo rango de edad es el de menor riesgo para de mortalidad materna. **Conclusiones.** En el presente trabajo se encontró que difiere el tiempo establecido como muerte materna para la OMS y para organismos de vigilancia y salud pública en el país. El rango de edad de mayor prevalencia de mortalidad materna en Norte de Santander es entre los 20 a 30 años. Aumento la Razón de Mortalidad Materna alejándose de las metas propuesta por la ONU y adoptadas por Colombia. Prevalece la condición de pobreza como un factor determinante para muerte materna. Se encontró mayor frecuencia de casos de mortalidad materna en mujeres nulíparas. Se establecen las infecciones como principal causa de muerte materna en norte de Santander seguidas de hemorragias y trastornos hipertensivos. **Palabras claves:** Razón de mortalidad materna, factores de riesgo para muerte materna ,epidemiología de la muerte materna.

