



Características sociodemográficas y quirúrgicas de los pacientes a los cuales se les realizó colecistectomía laparoscópica durante el periodo de enero de 2014 a febrero de 2018 en el hospital universitario Erasmo Meoz

Barrera Lizeth¹, Silva Lorena¹, Acevedo Gilmar¹, Hernández Hender², Valencia Paola³.

1. Estudiantes X Semestre programa de Medicina. Semillero de investigación HYGEA, Universidad de Pamplona.
2. Asesor Científico, Médico Cirujano general, subespecialista en cirugía laparoscópica, Hospital Universitario Erasmo Meoz.
3. Asesor Metodológico, Docente programa de Medicina Universidad de Pamplona.

Introducción. La colecistectomía laparoscópica es el procedimiento Gold Standard aceptado para la gestión de la enfermedad de la vesícula biliar y el más realizado en Colombia, pese a lo cual no existen reportes en nuestra ciudad sobre la caracterización y el rendimiento de la misma. Presenta tasas de conversión aproximadas al 10%, uno de los diagnósticos reportados de forma incidental es el carcinoma vesicular biliar entre 0,2 y 2,8% y son múltiples las complicaciones descritas como hidrocolecisto y picolecisto. **Objetivo.** Describir las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica durante el periodo enero de 2014 a febrero de 2018 en el Hospital Universitario Erasmo Meoz. **Metodología.** Estudio descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. Revisión de historias clínicas de casos de pacientes con litiasis vesicular, quienes recibieron abordaje quirúrgico inicialmente laparoscópico en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta enero de 2014 a febrero de 2018. **Resultados.** Se analizaron 437 pacientes del servicio de cirugía general de la ESE HUEM a los que se les realizó colecistectomía laparoscópica, se evidenció que el 71,2% estos pacientes eran de sexo femenino y el 28,8% de sexo masculino. Mostrando mayor incidencia en pacientes de sexo femenino menores de 65 años con un porcentaje del 61,1% en comparación con pacientes de sexo masculino menores de 65 años de 23,11%. **Conclusiones.** La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección de la litiasis vesicular, brindando los beneficios de la





DEPARTAMENTO DE MEDICINA

cirugía mínimamente invasiva, con similar rendimiento en términos de resultados al abordaje abierto.

Palabras claves: Enfermedad biliar, características clínicas, colecistectomía laparoscópica, conversión.

