FRECUENCIA DE CÁNCER DE PIEL Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA

Wilson Buenaver Merchán, Luz Elena Rodríguez Celis

RESUMEN

Objetivo. Determinar la frecuencia del cáncer de piel, factores de riesgo asociados, tipificación de cáncer más común y localización predominante de las lesiones en pacientes del servicio de consulta externa del Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Metodología. Estudio observacional y descriptivo a través de una revisión sistemática de historias clínicas comprendidas entre los años 2012 al 2015 en la Hospital Erasmo Meoz seguido de la aplicación de un cuestionario auto-referenciado que abarca factores sociodemográficos y genéticos del paciente, y finalmente el análisis estadístico de estos datos.

Resultados. El cáncer piel de mayor frecuencia fue el basocelular con un 75.6% seguido del escamocelular con 25.4% y el melanoma 1%, dentro del tipo de cáncer más frecuente del basocelular fue nodular con un 67.09 % y del escamocelular el 51.9 % de células grandes. De igual forma se identificaron una variedad de factores de riesgos entre los cuales se destacan sexo femenino 59.02%, no uso del bloqueador solar 95.66%, trabajo con exposición al sol 71.71% y fototipo III 54.15%. Finalmente la localización de predominio fue la nariz 43.41%.

PALABRAS CLAVES

Cáncer de piel, Factores de riesgo, Fototipo de piel