



INCIDENCIA DE PATOLOGÍA DE SENO EN PACIENTES QUE CONSULTARON PARA MAMOPLASTIA EN UN CONSULTARIO PRIVADO DE CÚCUTA

Johan Rafael Rodríguez López¹, Wilsson Gutiérrez Ramírez², José Alexander Rubiano Pedroza Msc³.

1. Semillero de investigación HYGEA, Universidad de Pamplona.
2. Médico Cirujano Plástico Clínica Norte, Asesor científico.
3. Docente Departamento de Medicina Universidad de Pamplona, Asesor metodológico.

Las patologías mamarias constituyen un grupo de entidades cuya incidencia es difícil estimar, aunque se ha observado que la frecuencia de patología benigna es mayor que la maligna. Dentro de las patologías benignas se encuentran la mastopatía fibroquística, que representa la alteración más común en la mama durante la madurez sexual y los fibroadenomas que constituyen la categoría más común de tumores benignos de la mama y dentro de las patologías malignas el cáncer de seno. La incidencia de las posibles patologías de seno en los hallazgos ecográficos de mujeres asintomáticas que consultaron para mamoplastia en un consultorio privado de la ciudad de Cúcuta durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2016, por medio de un estudio observacional transversal, con 439 pacientes mayores de 18 años que consultaron en el consultorio del doctor Wilsson Gutiérrez, en los cuales se observó: que los hallazgos normales se presentaron en mayor porcentaje (56%) en relación con los hallazgos que se reportaron alterados (44%); De los hallazgos ecográficos reportados como anormales se observa que la incidencia de la enfermedad fibroquística fue de un 81,5%, siendo así la que se presenta en mayor porcentaje seguido del hallazgo de fibroadenoma con un 11,7% , el hallazgo de la ruptura de las prótesis con un 5,6% y en menor porcentaje el hallazgo de una lesión sugestiva de cáncer con un 1,2 % (estos hallazgos se dieron en pacientes jóvenes). De la totalidad de hallazgos ecográficos alterados la lesión sugestiva de cáncer tiene una incidencia de 0,45%. Se puede concluir que los reportes de las ecografías que se realizan en pacientes asintomáticas como requisito pre quirúrgico para la mamoplastia, con mayor incidencia son de normalidad y de los hallazgos patológicos el de mayor incidencia es la enfermedad fibroquística, y que





DEPARTAMENTO DE MEDICINA

existen presentaciones atípicas por la edad de presentación del cancer de seno que deben ser tomadas en cuenta en estudios posteriores.

PALABRAS CLAVE: mamoplastia D016462, ultrasonografía mamaria D016217, Neoplasias de la mama D001943.

